



โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
KALASIN HOSPITAL

รายการยาเข้า-ออก บัญชียาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

รายการยาใหม่ที่ถูกพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

รายการยาใหม่ที่ถูกพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ชื่อการค้า	ชื่อสามัญทางยา	ประเภท	เงื่อนไขการสั่งใช้
1	Metalyse®	Tenecteplase 40 mg inj.	ED , ง	สั่งโดยแพทย์เฉพาะทาง - ใช้สำหรับ STEMI หรือเคยได้รับ SK มาแล้วภายใน 6 เดือน - ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ anterior wall STEMI ร่วมกับภาวะ hemodynamic instability ที่ไม่สามารถส่งทำ PCI ได้ภายใน 120 นาที
2	Milrinone	Milrinone	ED , ง	แพทย์เฉพาะทาง
3	HYDEX®	Dexmedetomidine HCl 200 mcg/2 ml	ED , ง	แพทย์เฉพาะทาง
4	Kemocarb®	Carboplatin 450 mg/45 ml	ED , ค	สั่งโดยสูติรีแพทย์
5	Marcaine spinal 0.5% ISOBARIC®	Bupivacaine hydrochloride	NED	
6	BCG-medec®	BCG (Bacillus Calmette-Guérin)	ED , ง	เฉพาะคล้ายแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

รายการยาใหม่ที่ถูกพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการยา	ชื่อการค้า	ประเภท	เงื่อนไขการสั่งใช้
7	Pilanz®	Olanzapine 5 mg tablet	NED	- เฉพาะจิตแพทย์ - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง
8	Bilaxten®	Bilastine 20 mg tablet	NED	- เฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง - indication : Allergic, Rhinoconjunctivitis, Urticaria
9	Anoro Ellipta®	Umeclidinium62.5 mcg/Vilanterol 25 mcg	ED , ค	- แพทย์เฉพาะทาง - เริ่มต้นการใช้เฉพาะในคลินิก COPD เท่านั้น
10	Glycophos®	Sodium Glycerophosphate	ED , ง	
11	Betmiga®	Mirabegron 50 mg tablet	NED	- เฉพาะศัลยแพทย์ - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง
12	AREPRA 10®	Aripiprazole 10 mg tablet	NED	- เฉพาะจิตแพทย์ - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง

รายการยาใหม่ที่ถูกพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการยา	ชื่อการค้า	ประเภท	เงื่อนไขการสั่งใช้
13	Sibatam®	Sulbactam sodium 2 g inj.	NED	- แพทย์เฉพาะทาง - บัญชียาควบคุมกลุ่ม 3
14	HEMAX®	EPOETIN ALFA 4000 IU	ED , จ2	ใช้ในสิทธิประกันสังคม
15	Dipsotrex Ointment®	Calcipotriol Ointment 0.005%	ED , จ	แพทย์เฉพาะทาง
16	Ryzodeg Flextouch®	30%Insulin Aspart + 70%Insulin Degludec	NED	- เฉพาะอายุรแพทย์ - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง - บัญชียาควบคุมกลุ่ม 3
17	Relpax®	Eletriptan hydrobromide 40 mg table	NED	- เฉพาะอายุรกรรมประสาท - เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง - ใช้เป็น second line drug
18	PRAMEXOL®	Pramipexole diHCl monohydrate 0.25 mg tablet	NED	เฉพาะสิทธิเบิกได้กรมบัญชีกลาง และชำระเงินเอง

รายการยาใหม่ที่ถูกพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการยา	ชื่อการค้า	ประเภท	เงื่อนไขการสั่งใช้
19	RYTMONORM®	Propafenone HCl 150 mg tablet	ED , จ	เฉพาะอายุรแพทย์โรคหัวใจ
20	MUCILIN ORANGE FLAVOUR®	Ispaghula husk 2.45 g/5 g	ED , ก	

Tenecteplase 40 mg (Metalyse®)



รูปแบบยา : Powder for injection

กลุ่มยา : Fibrinolytic drugs

ข้อบ่งใช้ : ใช้ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลัน (AMI: acute myocardial infarction) , STEMI

ขนาดยา : 0.5 mg/kg , Max dose = 10,000 unit (50 mg)

น้ำหนักตัว (kg)	Tenecteplase (unit)	Tenecteplase (mg)	ปริมาณของสารละลายที่ผสมแล้ว (ml)
< 60	6,000	30	6
60 to <70	7,000	35	7
≥70 to < 80	8,000	40	8
≥80 to < 90	9,000	45	9
≥ 90	10,000	50	10

อาการไม่พึงประสงค์ : ภาวะเลือดออกง่าย ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกตินี้พบได้ในทุกส่วนของร่างกาย และอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต หรือเกิดความพิการอย่างถาวร


การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C และป้องกันแสง

ความคงตัว : คงตัว 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 °C , คงตัว 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 °C

Milrinone

- รูปแบบยา :** -
- กลุ่มยา :** phosphodiesterase III inhibitors
- ข้อบ่งใช้ :** acute decompensated heart failure
- ขนาดยา :**
Loading dose: 50 mcg/kg IV slowly over 10 min
Maintenance dose: 0.125-0.75 mcg/kg/min continuous IV infusion
(Max dose 1.13 mg/kg/day)
- ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :** ไม่ควรให้นานเกิน 48 ชั่วโมง
- อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :** Headache, Hypotension, Supraventricular Tachycardia, Ventricular arrhythmia
- การเก็บรักษาและความคงตัว :** เก็บที่อุณหภูมิ 20 - 25 °C

Dexmedetomidine HCl 200 mcg/2 ml(HYDEX®)



รูปแบบยา : Concentrate for solution for infusion
กลุ่มยา : Sedative and analgesic peri-operative drug

ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
การสงบระงับเพื่อการทำหัตถการ: การสงบระงับในผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อน หรือระหว่างเข้ารับการผ่าตัด	IV Infusion 0.2-0.7 mcg/kg/hr
การสงบระงับในหน่วยบริบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU)	IV Infusion 0.2-0.7 mcg/kg/hr

ข้อห้ามใช้ : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นช้า

การเก็บรักษาและความคงตัว : เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C, ป้องกันแสง
 in-use stability : 72 ชั่วโมง
 ความคงตัวหลังผสมยา : สารละลายหลังเจือจางเก็บได้นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส

Carboplatin 450 mg/45 ml(Kemocarb®)



รูปแบบยา : Inhalation powder, pre-dispensed

กลุ่มยา : Platinum drugs (Alkylating agent)

ข้อบ่งใช้ : โรคมะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม และอาจใช้ร่วมกับเคมีบำบัดชนิดอื่นๆ, โรคมะเร็งปอดชนิด small cell โรคมะเร็งปอดชนิด non-small cell, โรคมะเร็งที่ศีรษะและคอ และโรคมะเร็งที่ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งที่อวัยวะ กระเพาะปัสสาวะและปากมดลูก

ขนาดยา : 360 mg/m² ของพื้นที่ผิวของร่างกาย IV infusion นานกว่า 15 นาที ถึง 1 ชม. ไม่ควรให้ยาบ่อยเกินกว่าทุก 4 สัปดาห์ และควรลดขนาดยาลงในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของการเกิดการกดไขกระดูก

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขั้นรุนแรงต่อ cisplatin หรือสารประกอบที่มีแพลตินัมเป็นองค์ประกอบอื่นๆ
- ห้ามใช้คาร์โบพลาตินในผู้ป่วยที่เกิดการกดไขกระดูกขั้นรุนแรงหรือเลือดออกอย่างมาก

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : เกล็ดเลือดต่ำ, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บยาในที่เย็นและที่มืด ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง เก็บในที่อุณหภูมิ 15-30 °C ป้องกันแสง
- สารน้ำที่เข้ากันได้ : 0.9% NSS , 5%DW
- Final conc. = 0.5 mg/ml
- หลังละลายยา : คงตัว 48 ชั่วโมงที่ 2-8 °C หรือ 24 ชั่วโมง ที่ 15-30 °C

Bupivacaine hydrochloride **(Marcaine spinal 0.5% ISOBARIC (20 mg/4 ml))**



รูปแบบยา: Sterile Isotonic Local Anaesthetic for injection

กลุ่มยา: ANAESTHETICS LOCAL

ข้อบ่งใช้: มีสรรพคุณ ทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่หรือชาเป็นบริเวณกว้าง, (LOCAL หรือ REGIONAL ANESTHESIA) หรือใช้บรรเทาปวดสำหรับการผ่าตัด

ขนาดยา: Acute pain: 30-60 mg

Surgical anaesthesia

- peripheral nerve block: 25 mg
- Lumbar epidural block: 50-100 mg

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- convulsion, cardiac arrhythmia, cardiac arrest, Hypotension, Bradycardia

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บยาในที่อุณหภูมิน้อยกว่า 25 °C (ห้ามแช่แข็ง)
- ควรใช้ยาทันทีหลังจากที่เปิดหลอดยาแล้ว ส่วนที่เหลือให้ทิ้งไป
- ไม่ควรเก็บยาโดยสัมผัสกับโลหะ เช่น เข็มฉีดยาหรือส่วนที่เป็นโลหะของกระบอกฉีด เนื่องจากไอออนของโลหะอาจจะละลายออกมาอยู่ในน้ำยา ซึ่งอาจจะทำให้บริเวณที่ฉีดยาบวมได้

BCG (Bacillus Calmette-Guérin) **(BCG - medac®)**



รูปแบบยา : Powder for suspension for intravesical

กลุ่มยา : Immunotherapy

ข้อบ่งใช้ :

- มะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย (non-invasive urothelial carcinoma)
- การรักษา carcinoma in situ (ในจุดแรกเริ่ม)
- การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของ Urothelial carcinoma ที่เกิดเฉพาะบริเวณ mucosa

ขนาดยา : Induction Therapy = 6 consecutive weekly (6 vials) after TUR 2-3 weeks
Maintenance Therapy = Induction Therapy +3 consecutive weekly (21 vials)

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ถูกรกภูมิคุ้มกัน หรือ คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ไม่ควรใช้ในคนที่เป็นวัณโรคก่อนที่จะรักษาด้วย BCG - medac
- ควรทดสอบผิวหนังด้วยทูเบอร์คูลิน ในรายที่ให้ผลบวกห้ามใช้ยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเคยได้รับการฉายแสงที่กระเพาะปัสสาวะมาแล้ว
- ห้ามใช้ในหญิงที่ให้นมบุตร
- ห้ามให้ทาง subcutaneous, intradermal, intramuscular, intravenous

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Painful, Cystitis, Haematuria and Fever (Handle with SPC direction)

การเก็บรักษาและความคงตัว : เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C

Olanzapine 5 mg tablet(Pilanz®)



รูปแบบยา : ORODISPERSIBLE TABLET

กลุ่มยา : thienobenzodiazepine

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาโรคจิตเภททั้งแบบเฉียบพลันและใช้ควบคุมอาการของโรค รวมทั้งโรคจิตอื่นๆ ที่มี positive symptoms และ negative symptoms
- ใช้รักษาอาการคลุ้มคลั่ง (manic episode) ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก
- ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย Olanzapine ที่มี bipolar disorder ร่วมด้วย

ขนาดยา :

- **Schizophrenia** Initially 10 mg once daily.
- **Manic episode** Initially 15 mg as single daily dose in monotherapy or 10 mg daily in combination therapy.
- **Prevention of recurrence in patients w/ bipolar disorder** Initially 10 mg once daily.
- **Manic episode & recurrence prevention in bipolar disorder during treatment for schizophrenia** Individualized dose. May subsequently adjust daily dose in 5-20 mg once daily.

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- Patients w/renal &/or hepatic impairment Lower starting dose: 5 mg.
- Moderate hepatic insufficiency (cirrhosis, Child-Pugh class A or B)Initially 5 mg.
- ห้ามใช้ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงของ narrow-angle glaucoma

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Orthostatic hypotension, Hypercholesterolemia, hyperprolactinemia, Constipation, EPS

การเก็บรักษาและความคงตัว : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดดและความร้อน

Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten®)



รูปแบบยา : ยาเม็ด

กลุ่มยา : Antihistamine

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาอาการจมูก-เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ (allergic rhino-conjunctivitis)
- ผื่นลมพิษ (urticaria)

ขนาดยา :

- ผู้ใหญ่ > 12 ปี : 20 มิลลิกรัม (1 เม็ด) วันละครั้ง
- ควรรับประทานยาหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือน้ำผลไม้

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : ง่วงนอน, ปวดศีรษะ, มีน้ำลาย

Umeclidinium 62.5 mcg/Vilanterol 25 mcg (Anoro Ellipta®)



รูปแบบยา : Inhalation powder, pre-dispensed

กลุ่มยา : Long Acting Muscarinic receptor Antagonist (LAMA) and Long acting beta2-adrenergic agonist (LABA)

ข้อบ่งใช้ : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

ขนาดยา : 1 puff วันละ 1 ครั้ง
(Max dose 1 puff OD)

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้โปรตีนในนมอย่างรุนแรง

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : nasopharyngitis (1%), ไอ(1%), ปวดศีรษะ (0.1%)

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30 °C
- อายุหลังจากเปิดใช้แล้วอยู่ได้ 6 สัปดาห์

Sodium Glycerophosphate(Glycophos®)



รูปแบบยา : Concentration for Solution for Infusion

กลุ่มยา : Intravenous Nutrition

ข้อบ่งใช้ : Glycophos มีข้อบ่งใช้เป็นสารอาหารเสริมที่ให้ทางเส้นเลือดดำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กทารก เพื่อให้มีปริมาณฟอสเฟตเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ขนาดยา :

- **ผู้ใหญ่:** 10-20 mmol/คน วันละ 1 ครั้ง (Max dose: 40 mmol/คน) ซึ่งเทียบเท่ากับการเติม Glycophos 10-20 ml
- **เด็กทารก:** 1.0-1.5 mmol/kg. body weight (Max dose: 3.5 mmol/kg. body weight)
- **ระยะเวลาการรักษา** 7-30 วัน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้หากมีภาวะร่างกายขาดน้ำ
- มีปริมาณโซเดียมในเลือดสูง
- มีปริมาณฟอสเฟตในเลือดสูง
- ไตทำงานบกพร่องขั้นรุนแรงและภาวะช็อก
- ควรใช้ด้วยความระวังในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง ต้องมีการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตสม่ำเสมอในผู้ป่วยทุกราย
- ไม่ควรให้ Glycophos โดยไม่เจือจาง

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C ห้ามแช่แข็ง
- หากเปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
- สามารถเจือจางกับสารละลายกลูโคส , NaCl และ SWI
- ความคงตัวหลังผสมยา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 2-8 °C และ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 20°C-25°C

Mirabegron 50 mg tablet(Betmiga®)



รูปแบบยา : Oval, yellow film-coated tablet

กลุ่มยา : selective beta 3-adrenoceptor agonist

ข้อบ่งใช้ : รักษาตามอาการในภาวะที่ปวดปัสสาวะและไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ (urgency) มีความถี่การถ่ายปัสสาวะเพิ่มขึ้น ปัสสาวะราดเนื่องจากกลั้นปัสสาวะไม่อยู่(urgency incontinence)

ขนาดยา : 50 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง รับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารได้
วิธีใช้ยา: กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว ตัดแบ่ง หรือทำให้แตกก่อนกลืน

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ตัวยาสสำคัญ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์นี้
- ไตทำงานบกพร่อง : ไม่มีการศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (GFR < 15 หรือผู้ป่วยที่กำลังต้องการการล้างไตด้วยวิธีการฟอกเลือด) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ยาใช้ในผู้ป่วยเหล่านี้
- ตับทำงานบกพร่อง : ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยตับทำงานบกพร่องรุนแรง (Child-Pugh Class C)
- ความดันโลหิตสูง : ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรุนแรงชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ (SBP $\geq$ 180 mm Hg และ/หรือ DBP $\geq$ 110 mm Hg)

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ, คลื่นไส้

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

Aripiprazole 10 mg tablet (AREPRA 10®)

รูปแบบยา: ORODISPERSIBLE TABLET
กลุ่มยา: dopamine agonists



ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
Acute manic/mixed episodes of bipolar disorder	Adult: As monotherapy: Initially, 15 mg once daily. As adjunctive therapy to lithium or valproate: Initially, 10-15 mg once daily. Dose may be increased according to patient response. Max: 30 mg daily.
Schizophrenia	Adult: Initially, 10 or 15 mg once daily. Maintenance: 15 mg once daily. Adjust dose at intervals of at least 2 weeks. Max: 30 mg daily.
Major depressive disorder	Adult: As adjunctive therapy to antidepressants: Initially, 2-5 mg once daily, may be adjusted gradually in increments of up to 5 mg at intervals of at least 1 week according to patient response and tolerability. Max: 15 mg daily.

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- Enhanced sedation with lorazepam. May increase plasma concentration with potent inhibitors of CYP2D6 (e.g. quinidine, fluoxetine, paroxetine) or CYP3A4 (e.g. ketoconazole, itraconazole, clarithromycin).
- May decrease plasma concentrations with potent CYP3A4 inducers (e.g. carbamazepine, rifampicin, rifabutin, phenytoin, phenobarbital, primidone, efavirenz, nevirapine).
- Increased risk of serotonin syndrome with other serotonergic drugs (e.g. serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, SSRIs).

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Decreased HDL cholesterol (14%), hypercholesterolemia (4% to 22%), increased LDL cholesterol (10% to 14%), increased serum triglycerides (7% to 27%), weight gain (17% to 22%)

การเก็บรักษาและความคงตัว

- สภาวะการเก็บรักษา: เก็บยาในรูปแบบเม็ด หรือยาน้ำ ไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น

Sulbactam sodium 2 g inj.(Sibatam®)



รูปแบบยา : powders for solutions for injections

กลุ่มยา : β -lactamase inhibitor

ข้อบ่งใช้ : รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียระดับปานกลางถึงรุนแรง ในการติดเชื้อ *Acinetobacter baumannii*

ขนาดยา :

- กรณี *A.baum* MDR ให้ Sulbactam 6 g/day (แบ่งให้ทุก 6-8 ชั่วโมง)
- กรณีให้ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดฉีดตัวอื่นในกลุ่ม B-lactam : 0.5-1 g ทุก 6-12 ชั่วโมง (Max dose: 4 g/day)
- ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- เนื่องจากยามีโซเดียมเป็นองค์ประกอบจึงควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ การได้รับ Sulbactam sodium 2 g จะทำให้ได้รับโซเดียมประมาณ 8.6 mmol
- สำหรับรายที่มีช่วงการรักษา ควรพิจารณาติดตามการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การทำงานของไต ตับ และระบบการสร้างเม็ดเลือด

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน มวนท้อง ปวดท้อง

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
- สารน้ำที่เข้ากันได้ : 0.9%NSS , 5%DW
- ความคงตัวหลังผสม : 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25-30 °C หรือ 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 °C

EPOETIN ALFA 4000 IU (HEMAX®)

รูปแบบยา LYOPHILISATE AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION
กลุ่มยา Hematopoietic Agent

ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
Anemia Associated with Chronic Renal Failure	Initial dose: 50 to 100 units/kg IV or subcutaneously 3 times a week
Anemia Associated with Zidovudine	100 units/kg IV or subcutaneously 3 times a week
Anemia Associated with Chemotherapy	150 units/kg subcutaneously 3 times a week or 40,000 units subcutaneously once a week

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- Hypertension, Headache, Pruritus, skin rash, Nausea, vomiting

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- เนื่องจากยาีมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้ ดังนั้นจึงต้องระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ดี และในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหรือมีความเสี่ยงต่อการชัก

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บยาในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C เก็บในช่องธรรมดาของตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- ไม่ให้ถูกแสง และก่อนฉีดยาควรนำออกมาวางไว้จนยาีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที



Calcipotriol Ointment 0.005% (Dipsotrex Ointment®)



รูปแบบยา : Ointment

กลุ่มยา : Psoriasis, Seborrhea & Ichthyosis Preparations

ข้อบ่งใช้ : สำหรับทาภายนอกเพื่อการรักษาโรคสะเก็ดงา (psoriasis plaques)

ขนาดยา : ทา Calcipotriol ointment วันละครั้ง ให้ทั่วบริเวณที่เกิดโรคสะเก็ดงา ปริมาณสูงสุดต่อสัปดาห์ไม่เกิน 100 กรัม

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- เกิดภาวะภูมิไวเกินต่อ calcipotriol หรือส่วนประกอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์นี้
- ผู้ป่วยที่ทราบแน่ชัดหรือยังมีข้อสงสัยว่ามีภาวะของ calcium metabolism ผิดปกติ
- ห้ามทาบริเวณใบหน้า

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- การเกิดรอยไหม้ คัน และการระคายเคืองผิวหนัง

การเก็บรักษาและความคงตัว

- สภาวะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C และห่างจากมือเด็ก
- การป้องกันแสง : เก็บพ้นแสง
- อายุยา (Shelf-Life): 2 ปี

Insulin Ideg/Asp 30 (Prefilled) (Ryzodeg Flextouch®) **(contain 30%Insulin Aspart + 70%Insulin Degludec)**



รูปแบบยา : สารละลายสำหรับฉีดในปากกาอินซูลิน, ใส, ไม่มีสี

กลุ่มยา : อินซูลิน สำหรับฉีดชนิดออกฤทธิ์ปานกลางหรือชนิดออกฤทธิ์ยาวผสมกับออกฤทธิ์เร็ว

ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่วัยรุ่นและเด็กอายุมากกว่าสองปีขึ้นไป

ขนาดยา :

- ขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำต่อวัน : 10 ยูนิต โดยให้ยาพร้อมกับมื้ออาหารต่อจากนั้น ให้ปรับขนาดยาตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย
- สามารถให้ได้วันละ 1 หรือ 2 ครั้งพร้อมกับอาหารมื้อหลัก
- หากจำเป็นผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนเวลาการให้ยาได้ โดยจำเป็นต้องให้ยาพร้อมกับอาหารมื้อใหญ่เมื่อใช้วันละ 1 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ผู้ที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
- ผู้ที่แพ้ยา Ryzodeg® FlexTouch® หรือตัวยาอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้เช่นเดียวกับอินซูลินชนิดอื่น ๆ
- อาการคัน บวม แดง ณ ตำแหน่งที่ฉีด

การเก็บรักษาและความคงตัว

- เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง
- หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก สามารถเก็บยาได้ 4 สัปดาห์ โดยเก็บในตู้เย็น ห้ามเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิเกิน 30 °C

Eletriptan hydrobromide 40 mg tablet(Relpax®)



รูปแบบยา: Film coated tablet

กลุ่มยา: Antimigraine drugs

ข้อบ่งใช้: ใช้ในการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลันทั้งที่มีหรือไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า

ขนาดยา: รับประทาน 1 เม็ดทันทีที่เริ่มปวดศีรษะไมเกรน หากอาการยังไม่ดีขึ้นรับประทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 2 ชั่วโมง (**Max dose: 80 mg/day**)

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้:

- ผู้ป่วยความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้,
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่เคยมี MI,
- ผู้ป่วยที่มีการใช้ergotamine ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนหรือหลังการได้รับ relpax

Drug interaction:

- ยาที่มีผลเพิ่มฤทธิ์ของ serotoni, ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง enzyme CYP3A4 และยา 5-HT receptor agonist ตัวอื่นๆ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย:

- การเกิดรอยไหม้ คัน และการระคายเคืองผิวหนัง
- ผื่นแพ้สัมผัส รุขบนอกเสบ จุดด่างดำ ผิวบาง และภาวะแคลเซียมในเลือดสูง

การเก็บรักษาและความคงตัว:

- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
- เก็บพ้นแสง

Pramipexole diHCl monohydrate 0.25 mg tablet (PRAMEXOL®)



รูปแบบยา : Tablet

กลุ่มยา : non-ergot dopamine agonist

ข้อบ่งใช้	ขนาดยา
รักษาอาการและอาการแสดงของโรคพาร์กินสันชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic Parkinson's disease)	0.375 mg/วัน แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง - สามารถปรับเพิ่มขนาดยาครั้งละ 0.125 mg/วัน ทุก 5-7 วัน - ใช้ขนาดยา 1.5-4.5 mg/วัน
รักษาอาการกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Restless Legs Syndrome)	0.125 mg OD รับประทานก่อนนอน - สามารถเพิ่มขนาดยาได้อีก 1 เท่าหลังจากใช้ยาไปแล้วทุก 4-7 วัน จนถึงขนาดยา 0.5 mg/วัน (Max dose: 0.5 mg/วัน)

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ช่วงที่รับประทานอาจเกิดอาการประสาทหลอนได้
- ใช้ยาร่วมกับยาในกลุ่มโดปามีน แล้วหยุดยาในกลุ่มโดปามีนอย่างกะทันหัน อาจเกิดอาการของ neuroleptic malignant syndrome ได้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีไตการทำงานบกพร่อง ควรมีการปรับขนาดยา

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง, มึนงง ช่วงนอน นอนไม่หลับ ประสาทหลอน, คลื่นไส้ ท้องผูก, อ่อนล้า dyskinesia, EPS

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C เก็บให้พ้นแสง

Propafenone HCl 150 mg tablet (RYTMONORM®)



รูปแบบยา : Tablet

กลุ่มยา : Anti-arrhythmic drugs

ข้อบ่งใช้ : Symptomatic supraventricular tachyarrhythmias / supraventricular tachycardia in WPW syndrome หรือ PAF / Severe Ventricular tachyarrhythmias

ขนาดยา :

- Usual dose ผู้ใหญ่ 450 – 600 mg โดยแบ่งให้ 2-3 ครั้งต่อวัน
- เด็ก 10-20 mg/kg โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้ง
- **Max dose : 900 mg/day**

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ห้ามใช้ในคนไข้ที่มีประวัติการแพ้
- Brugada syndrome
- ผู้ป่วยที่เกิดอาการกลืนเนื้อหัวใจขาดเลือดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- Myasthenia gravis
- ผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยา Ritonavir

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- เวียนศีรษะ, cardiac conduction disorder และอาการใจสั่น

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

Ispaghula husk 2.45 g/5 g (MUCILIN ORANGE FLAVOUR®)



รูปแบบยา : powder for oral suspension, 5 g sachet

กลุ่มยา : Laxatives

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาอาการท้องผูกแบบเรื้อรัง (habitual constipation)
- ช่วยให้ถ่ายอุจจาระง่ายขึ้นโดยการทำให้อุจจาระนุ่ม เช่น ในผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดไส้ตรงหรือทวารหนัก แผลรอยแยกที่ทวารหนักและโรคริดสีดวงทวาร
- ผู้ป่วยที่สมควรได้รับกากอาหารที่มีไฟเบอร์เพิ่มขึ้น เช่น ใช้เสริมในการรักษาผู้ป่วย IBS (irritable bowel syndrome) ที่มีอาการท้องผูกเด่น ใช้เสริมกับอาหารในผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูง

ขนาดยา :

- 6-12 ปี: รับประทานครั้งละ ½ ช้อน วันละ 3 ครั้ง
- >12 ปี ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: รับประทานวันละ 1 ช้อน วันละ 3 ครั้ง

ข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ :

- ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการถ่ายอุจจาระผิดปกติ (Bowel Habit Change) อย่างฉับพลันนานกว่า 2 สัปดาห์ มีเลือดออกจากลำไส้ตรงที่ยังไม่ได้วินิจฉัยสาเหตุ ไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้หลังจากการใช้ยาระบาย
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการตีบตันของทางเดินอาหาร มีโรคของหลอดอาหารและส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร (Oesophagus and Cardia) มีการอุดตันของลำไส้ (ileus) อยู่ก่อนหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ลำไส้ไม่บีบตัว (Intestinal paralysis) ลำไส้ใหญ่หดรัดตัว (Megacolon)
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำคอ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : ท้องอืด, กรณีดื่มน้ำไม่เพียงพออาจทำให้ลำไส้อุดตันได้

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บในภาชนะปิดสนิท ป้องกันความชื้น

Aescin 20 mg tablet(Reparil®)

รูปแบบยา : Enteric coated tablet

กลุ่มยา : Capillary-Stabilizing agents

ข้อบ่งใช้ :

- ใช้สำหรับรักษาอาการฟกช้ำ ปวดเคล็ด ห้อเลือด หรือการอักเสบของเส้นเอ็นจากการได้รับบาดเจ็บ

ขนาดยา :

- ผู้ใหญ่ > 14 ปี 2x3 po pc กรณีที่มีอาการไม่รุนแรง
- ขนาดยารักษาต่อเนื่อง : 1x3 po pc
- เด็กอายุ 7-14 ปี ให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง
- เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ไม่แนะนำให้รับประทาน

อาการไม่พึงประสงค์ : ถ่ายเหลว มีนงง ปวดหัว

การเก็บรักษาและความคงตัว : เก็บที่อุณหภูมิห้อง






โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
KALASIN HOSPITAL

รายการยาใหม่ที่ได้รับการพิจารณาแทนยาเดิม

รายการยาใหม่ที่ได้รับการพิจารณาแทนยาเดิม

ลำดับ	รายการยา	ชื่อการค้า	ประเภท	หมายเหตุ
1	Ruriocticog alfa pegol 500 IU	Adynovate®	ED, จ2	แทน Advate 250 IU
2	Purified Equine Antirabies Serum	TRCS ERIG® 2 ml	ED, ก	แทนตัวเดิม 5 ml
3	Triptorelin pamoate 11.25 mg	Diphereline® 11.25 mg	ED, จ	แทน Leuprorelin acetate INJ. 11.25 mg
4	Cilostazol 100 mg	Pletaal® SR Cap 100 mg	NED	แทน Pletaal power
5	Aescin 20 mg	Reparil® 20 mg	NED	แทน Actonel
6	Donepezil HCl 10 mg	Aricept® Evess	ED, จ	แทน Donepezil 10 mg เดิม
7	Budesonide/Formoterol 160/4.5 mcg	Symbicort Turbuhaler® 160/4.5 mcg	ED, ค	แทน Duoresp spiromax
8	Insulin glargine 100 IU	Gansulog®	ED, จ	แทน Levemir
9	Bismuth subsalicylate 1048 mg	Gastro Bismol-L®	ED, จ	แทน Bismuth subsalicylate 524 mg

ยาเดิม
Advate® (factor VIII)
250 IU/2 ml



ยาใหม่
Adynovate® (factor VIII)
500 IU/2 ml



บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย) จำกัด /
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

Rurioctocog alfa pegol 500 IU (Adynovate®)



บริษัท ทาเคด้า(ประเทศไทย) จำกัด /
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รูปแบบยา : Vial

กลุ่มยา : Hemostatics; Coagulation Factor VIII

ข้อบ่งใช้ : ใช้รักษาและป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรค Hemophilia A

ขนาดยา :


- On demand treatment: Dose (IU) = BW(kg)*desired FVIII*0.5
- Prophylaxis
 - Adult: 40-50 IU/Kg twice weekly
 - Children <12 years old: 40-60 IU/Kg twice weekly

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย : ปวดศีรษะ ท้องเสีย ผื่นคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ลมพิษ

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บในที่เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C เก็บยาในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- ที่อุณหภูมิมากกว่า 30 °C อยู่ได้นาน 3 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น
- เตรียมหรือเปิดใช้แล้ว สามารถใช้ได้ภายใน 3 ชั่วโมง หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

ยาเดิม
VINRAB® 1000 IU/5 ml



ยาใหม่
TRCS ERIG® 400 IU/ 2 ml



บริษัท ไบโอวาเลียส จำกัด

Purified Equine Antirabies Serum (TRCS ERIG[®] 2 ML)



บริษัท ไบโอวาเลีย จำกัด

รูปแบบยา : Solution for injection

กลุ่มยา : Immunological products and vaccines

วิธีใช้ : สำหรับฉีดบริเวณในและรอบบาดแผล

ข้อบ่งใช้ :

- สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ที่มีการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าระดับรุนแรง คือ ถูกสัตว์ที่มีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด หรือในผู้ที่ถูกสัตว์ที่คาดว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด ช่วนจนเกิดบาดแผลทะลุชั้นผิวหนัง

ขนาดยา :

- **ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 40 IU/Kg** ควรฉีดเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีเมื่อสัตว์กัด
- ให้ฉีดเซรุ่มบริเวณในและรอบแผล ครอบคลุมแผลให้มากที่สุด

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- อาการแพ้เฉียบพลันที่สังเกตได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ หายใจลำบาก ลมพิษผื่นคัน
- อาการแพ้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อที่สังเกตได้ คือ ปฏิกิริยาการอักเสบ มีไข้ ลมพิษผื่นคัน ช็อคอักเสบ

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- ควรเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง เก็บให้พ้นแสง
- เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 28-32 °C คงตัวได้ 30 วัน
- หลังการเปิดใช้ครั้งแรก คงตัวได้ 8 ชั่วโมง เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C

ยาเดิม

Triptorelin acetate 11.25 mg
Powder for injection (Pre-Filled Syringe)



ยาใหม่

Triptorelin pamoate 11.25 mg
Lyophilisate and solvent for solution for injection



บริษัท Ipsen pharma biotech /
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

Triptorelin pamoate 11.25 mg(Diphereline®)



บริษัท Ipsen pharma biotech /
บริษัท ชิลลิก ฟาร์มา จำกัด

รูปแบบยา : Lyophilisate and solvent for solution for injection

กลุ่มยา : Malignant disease and immunosuppression

ข้อบ่งใช้ :

- ภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty
- adjuvant therapy ร่วมกับรังสีรักษาในมะเร็งต่อมลูกหมาก
- ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามาก่อน

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- ปวดบริเวณที่ฉีดยา ความต้องการทางเพศลดลง อาการชาบริเวณขาหรือลำตัวส่วนล่าง มีอาการร้อนวูบวาบ รู้สึกอ่อนแรงหรือไม่แข็งแรง

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C เก็บให้พ้นความร้อน
- แนะนำให้เตรียมยาและฉีดทันทีหลังผสม เนื่องจากหลังผสมยาจะอยู่ในรูปยาแขวนตะกอน

ยาเดิม
Pletaal® (Cilostazol 100 mg)
powder



ยาใหม่
Pletaal® (Cilostazol 100 mg)
SR capsule



บริษัท ไทยโอซูก้า /
บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด

Cilostazol 100 mg (Pletaal® SR Cap 100 mg)



บริษัท ไทยโอซูก้า /
บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด

รูปแบบยา : capsule

กลุ่มยา : Antiplatelet drugs

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของหลอดเลือดแดงเรื้อรัง เช่น การเกิดแผล (ulceration) ความเจ็บปวด อาการเย็นตามปลายมือปลายเท้า
- ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของภาวะเนื้อสมองตายเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน (cerebral infarction)

ขนาดยา :

- ขนาดปกติที่ใช้ในผู้ใหญ่ : 200 มิลลิกรัม วันละครั้ง รับประทานยาเมื่อท้องว่าง

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย :

- ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ ท้องเสีย และคลื่นไส้อาเจียน

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
- เก็บให้พ้นแสง

ยาเดิม
Budesonide/Formoterol
320/9 mcg, 60 doses
Duoresp spiromax



ยาใหม่
Budesonide/Formoterol
160/4.5 mcg, 120 doses
Symbicort turbuhaler



บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด

Budesonide/Formoterol 160/4.5 mcg, 120 doses (Symbicort®)



บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C
- ปิดฝาให้สนิทหลังจากเปิดใช้แล้ว
- ยามีอายุถึงตามที่ใช้ข้างกล่องระบุ

รูปแบบยา: ยาผงสำหรับสูดผ่านเครื่องสูดยา

ข้อบ่งใช้:

- โรคหืด (Asthma)
 - A: เป็นยาต้านการอักเสบสำหรับบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคไม่รุนแรง
 - B: สำหรับรักษาแบบควบคุมอาการด้วยปริมาณยาที่คงที่
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 - รักษาอาการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีค่า FEV1 $\leq$ 70% ของค่าปกติ (หลังรับยาขยายหลอดลม) และมีประวัติอาการกำเริบแม้ว่าจะได้ยาขยายหลอดลมอยู่เป็นประจำ

ขนาดยา

- โรคหืด (Asthma)
 - A: ครั้งละ 1 สูด แบบสูดยาตามต้องการเมื่อมี อาการ ถ้าอาการยังคงอยู่หลังจากนั้น 2-3 นาที ควรสูดยาเพิ่ม จำนวนครั้งของการสูดยาทั้งหมดสูงสุดถึง 12 ครั้งต่อวัน
 - B: ครั้งละ 1-2 สูด วันละ 2 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำต่อวัน สำหรับการรักษาต่อเนื่องแบบควบคุมอาการ คือ 4 สูด (ครั้งละ 2 สูด วันละ 2 ครั้ง)
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): ผู้ใหญ่: สูดครั้งละ 1 สูด วันละ 2 ครั้ง

อาการไม่พึงประสงค์ : มีอัสติเนีย อาการใจสั่น

ยาเดิม
Insulin detemir 100 IU/ml



ยาใหม่
Insulin glargine 100 IU/ml
(Gansulog® penfill)



บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด

Insulin glargine 100 IU/ml (Gansulog®)



บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด

รูปแบบยา : Solution for Injection

กลุ่มยา : Insulins and analogues

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องใช้อินซูลิน รักษาในผู้ใหญ่ วัยรุ่นและเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

ขนาดยา :

- เบาหวานชนิดที่ 1: ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
 - ขนาดยาเริ่มต้น: ประมาณ 1 ใน 3 ของความต้องการอินซูลินต่อวัน บริหารวันละครั้ง
- เบาหวานชนิดที่ 2: ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
 - Initial basal insulin dose: 0.2 หน่วย/กิโลกรัม วันละครั้ง

อาการไม่พึงประสงค์:

- Hypoglycemia
- บวมแดง คัน ปวด บริเวณที่ฉีด


การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง
- เก็บให้พ้นแสง
- หลังจากเปิดใช้แล้ว ยายังคงมีความคงตัว 28 วัน

ยาเดิม
Bismuth subsalicylate **524 mg**
(Besmal®)



ยาใหม่
Bismuth subsalicylate **1048 mg**
(Gastro Bismol-L®)



บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด

Bismuth subsalicylate 1048 mg (Gastro Bismol-L®)



บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รูปแบบยา : Compressed tablet

กลุ่มยา : Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

ข้อบ่งใช้ :

- บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
- รักษาอาการท้องเสีย จากการเดินทาง (Traveler's diarrhea) และอาหารเป็นพิษ
- รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบโดยให้ร่วมกับยาต้านจุลชีพอื่นที่เหมาะสม

ขนาดยา :

- ทัวไป ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- เด็ก 9 - 12 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- สามารถรับประทานซ้ำได้ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาอาการ สามารถรับประทานได้สูงสุด 4 ครั้งต่อวัน

อาการไม่พึงประสงค์ :

- อุจจาระอาจมีสีเข้มขึ้นถึงดำ ไม่อันตราย สามารถหายเองได้หลังจากหยุดยา

การเก็บรักษาและความคงตัว :

- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C และเก็บให้พ้นแสง




โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
KALASIN HOSPITAL

สรุปผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงบริษัท

ยาเดิม
Donepezil HCl 10 mg
(Ceptia®)



บริษัท เกสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
ประเทศไทย



ยาใหม่
Donepezil HCl 10 mg
(Aricept®)



บริษัท DKSH (Thailand) Limited

ยาเดิม

Lubric-eyes®

(Dextran 70 +

Hydroxypropylmethylcellulose)



ยาใหม่

Tranceltear®

(Dextran 70 + **Hypromellose**)



บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด/ประเทศไทย


บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด/ประเทศไทย

ยาเดิม

Transamin®
(Tranexamic acid 250 mg)



บริษัท อูยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์
แคร์ จำกัด/ประเทศไทย



ยาใหม่

Axamin® capsule
(Tranexamic acid 250 mg)



บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

ยาเดิม

Povanil® 0.5
(Clonazepam 0.5 mg)



Povanil® 2
(Clonazepam 2 mg)



บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด ประเทศไทย



ยาใหม่

Prenarpil® 0.5
(Clonazepam 0.5 mg)



Prenarpil® 2
(Clonazepam 2 mg)



บริษัท ฟาร์มิน่า จำกัด ประเทศไทย

ยาเดิม
Mealin 30®
 (Mianserin HCl 30 mg)



บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด, ประเทศไทย

ยาใหม่
Mianserin®
 (Mianserin HCl 30 mg)



บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

ยาเดิม

Fulox 20®

(Fluoxetine HCl 20 mg)



บริษัท The medicpharma CO., LTD.
ประเทศไทย



ยาใหม่

Oxetine®

(Fluoxetine HCl 20 mg)



บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

ยาเดิม
Quapine®
 (Quetiapine 200 mg)
 tablet



องค์การเภสัชกรรม ประเทศไทย

ยาใหม่
Quantia®
 (Quetiapine 200 mg)



บริษัท เมดไลน์ จำกัด

ยาเดิม
Pepfamin®
(Famotidine 20 mg)



บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลล จำกัด
ประเทศไทย



ยาใหม่
Famoc®
(Famotidine 20 mg)



บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตร์ จำกัด
ประเทศไทย

ยาเดิม
Red shot®
(Iron sucrose)



บริษัท อี ยู ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ประเทศไทย



ยาใหม่
Encifer®
(Iron sucrose)



บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด

ยาเดิม
Orata 0.5®
(Entecavir 0.5 mg)



**บริษัท ยูนิซัน จำกัด
ประเทศไทย**



ยาใหม่
Hepivir®
(Entecavir 0.5 mg)



บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา